

	<p align="center">SuedOstLink - BBPIG Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a –</p>	
	<p align="center">Abschnitt D2 Nittenau bis Pfatter</p> <p align="center">Unterlagen gemäß § 21 NABEG</p>	<p>Das Vorhaben Nr. 5 im SuedOstLink ist von der Europäischen Union gefördert; sie haftet nicht für die Inhalte.</p>  <p>Kofinanziert von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union</p>
<p align="center">Anlage L5.2.2.1 – Ergebnisse der Brutvogel-Revierkartierung pro Probefläche</p>		

00	29.06.2023	Unterlage gemäß § 21 NABEG	ARGE U P. Vogler	ARGE U M. Wicke	TenneT M. Schafhirt
Rev.	Datum	Ausgabe	Erstellt	Geprüft	Freigegeben

Festgestellt nach §24 NABEG
Bonn, den

8 Anlagen

8.1 Anlage L5.2.2.1 – Ergebnisse der Brutvogel-Revierkartierung pro Probefläche

Tabelle 18: Detaillierte Zusammenstellung der Reviere besonders planungsrelevanter Brutvogelarten sowie der Beobachtungen von Nahrungsgästen (NG), Überfliegern (ÜF) und Durchzüglern (DZ) innerhalb der PF im Abschnitt D2.

Deutscher Name	Revieranzahl auf Probeflächen					Gesamte Revieranzahl
	01	02	03	04	05	
Baumfalke	-	-	NG	1	-	1
Baumpieper	-	1	-	-	-	1
Bienenfresser	-	-	ÜF	-	-	0
Blaukehlchen	-	-	-	-	2	2
Bluthänfling	NG	1	-	-	-	1
Brachvogel	-	-	-	1	NG	1
Braunkehlchen ¹⁾	-	-	-	-	-	0
Dohle ²⁾	-	-	-	N ³⁾	-	N
Dorngrasmücke	1	1	-	3	3	8
Drosselrohrsänger	-	-	-	-	1	1
Eisvogel	1	1	1	1	1	5
Erlenzeisig	-	-	ÜF	-	-	0
Feldlerche	7	5	2	3	7	24
Feldschwirl	-	-	DZ	1	3	4
Feldsperling	7	4	18	13	19	61
Flusseeeschwalbe	-	-	-	-	NG	0
Gänsesäger	-	-	-	NG	-	0
Gartenrotschwanz	-	-	DZ	-	-	0
Gelbspötter	-	-	-	2	6	8
Goldammer	14	14	10	15	20	73
Graureiher	-	NG	NG	NG	NG	0
Grauschnäpper	-	1	1	3	3	8
Grauspecht	-	-	-	1	1	2
Grünspecht	1	1	1	1	1	5
Habicht	NG	NG	-	-	NG	0
Haubentaucher	-	-	-	-	1	1

Deutscher Name	Revieranzahl auf Probeflächen					Gesamte Revieranzahl
	01	02	03	04	05	
Haussperling ²⁾	-	-	N	-	N	N
Heidelerche	1	-	1	-	-	2
Höckerschwan	-	-	-	1	1	2
Hohltaube	-	1	3	-	NG	4
Kiebitz	-	-	-	ÜF	1	1
Klappergrasmücke	1	-	DZ	-	-	1
Kleinspecht	1	1	-	-	-	2
Kolkrabe	1	1	1	-	-	3
Kormoran	-	-	-	NG	-	0
Kuckuck	-	-	-	2	2	4
Lachmöwe	-	-	-	-	NG	0
Mauersegler ²⁾	-	-	N	-	-	N
Mäusebussard	1	1	2	NG	NG	4
Mehlschwalbe ²⁾	-	-	-	-	N	N
Mittelmeermöwe	-	-	-	NG	NG	0
Mittelspecht ¹⁾	-	-	-	-	-	0
Nachtigall	-	-	-	1	-	1
Nachtreiher	-	-	-	-	NG	0
Neuntöter	1	3	5	1	4	14
Pirol	-	1	1	1	2	5
Purpurreiher	-	-	-	-	NG	0
Rauchschwalbe ²⁾	-	-	N	-	N	N
Rebhuhn ⁴⁾	-	-	-	-	-	0
Rohrschwirl	-	-	-	-	1	1
Rohrweihe	-	-	-	NG	NG	0
Rotmilan	NG	NG	1	-	-	1
Schilfrohrsänger	-	-	-	-	1	1
Schnatterente	-	-	-	1	2	3
Schwarzmilan	NG	-	-	-	-	0
Schwarzspecht	1	1	2	-	1	5
Schwarzstorch	-	NG	-	-	-	0

Deutscher Name	Revieranzahl auf Probeflächen					Gesamte Revieranzahl
	01	02	03	04	05	
Silberreiher	-	-	-	NG	NG	0
Sperber	NG	1	1	NG	1	3
Sperlingskauz	-	-	1	-	-	1
Star	26–27	20	16	15	17	94–95
Stieglitz	3	7	1	3	12	26
Teichhuhn	-	-	1	-	1	2
Teichrohrsänger	-	-	-	1	18	19
Turmfalke	1	3	1	1	1	7
Turteltaube ²⁾	-	-	-	-	-	0
Wachtel	-	3	-	-	1	4
Waldkauz	-	-	1	-	-	1
Waldlaubsänger	1	-	3	-	-	4
Waldschnepfe	-	-	DZ	-	-	0
Wasserralle	-	-	-	-	1	1
Wendehals	1	1	DZ	-	-	2
Wespenbussard	1	1	NG	-	-	2
Wiesenschafstelze	-	-	-	6	8	14
Zwergtaucher	-	-	-	-	2	2
Gesamtanzahl Reviere	71-72	74	74	78	145	442-443

Legende:

NG: Nahrungsgast; **ÜF:** Überflieger; **DZ:** Durchzügler

Info: Sofern für eine Art zumindest eine Brutzeitfeststellung in einer PF erbracht wurde, entfällt im Hinblick auf die entsprechende PF eine Angabe des Status als NG, ÜF oder DZ.

¹⁾Diese Art wurde lediglich als Zusatzfund außerhalb der PF nachgewiesen.

²⁾Der Brutbestand dieser mitunter kolonieartig in Siedlungen bzw. an Gebäuden brütenden Arten wurde während der durchgeführten Revierkartierung an Siedlungsrändern (Gebäude und Siedlungen wurden aus den PF überwiegend ausgespart) nicht systematisch erfasst. Daher erfolgt für diese Arten bei Brutnachweisen, Brutverdachten und Brutzeitfeststellungen lediglich die Angabe „N“ (= Nachweis).

³⁾Von der Dohle wurde eine Kolonie von mindestens fünf Brutpaaren im Bereich der Schleuse an der Donau nachgewiesen.

⁴⁾Das Rebhuhn wurde außerhalb seiner artspezifischen Brutzeit festgestellt. Aufgrund der geringen Mobilität der Art ist dennoch davon auszugehen, dass das Rebhuhn in diesem Gebiet als Brutvogel vorkommt. Konkrete Reviere der Art konnten dabei aber nicht erfasst werden.

Tabelle 19: Maximale geschätzte Revieranzahl (aus sechs Durchgängen) und Häufigkeitsklassen der ubiquitären Brutvogelarten pro PF. Ein Vorkommen ohne Bruthinweis wird in den bekannten Kategorien Nahrungsgast (NG), Überflieger (ÜF) und Durchzügler (DZ) dargestellt.

Deutscher Name	Max. Revieranzahl auf Probeflächen					Gesamte Revieranzahl
	01	02	03	04	05	
Amsel	32 (E)	12 (D)	25 (E)	8 (D)	14 (D)	91
Bachstelze	3 (B)	2 (B)	2 (B)	2 (B)	4 (C)	13
Blässhuhn	-	-	-	-	3 (B)	3
Blaumeise	11 (D)	20 (D)	5 (C)	2 (B)	10 (D)	48
Buchfink	36 (E)	28 (E)	33 (E)	4 (C)	11 (D)	112
Buntspecht ¹⁾	6	4	5	-	2	17
Eichelhäher	4 (C)	4 (C)	5 (C)	1 (A)	1 (A)	15
Elster	2 (B)	-	-	1 (A)	2 (B)	5
Fichtenkreuzschnabel	ÜF	1 (A)	ÜF	-	-	1
Fitis	4 (C)	-	1 (A)	4 (C)	2 (B)	11
Gartenbaumläufer	-	1 (A)	-	2 (B)	1 (A)	4
Gartengrasmücke	11 (D)	5 (C)	4 (C)	10 (D)	9 (D)	39
Gebirgsstelze	2 (B)	3 (B)	1 (A)	-	1 (A)	7
Gimpel	1 (A)	-	2 (B)	-	-	3
Grünfink	4 (C)	6 (C)	6 (C)	3 (B)	4 (C)	23
Haubenmeise	7 (C)	9 (D)	5 (C)	-	-	21
Hausrotschwanz	-	2 (B)	5 (C)	2 (B)	2 (B)	11
Heckenbraunelle	9 (D)	5 (C)	3 (B)	4 (C)	7 (C)	28
Jagdfasan	1 (A)	-	-	2 (B)	4 (C)	7
Kernbeißer	5 (C)	1 (A)	2 (B)	2 (B)	1 (A)	11
Kleiber	10 (D)	15 (D)	9 (D)	-	-	34
Kohlmeise	20 (D)	17 (D)	14 (D)	3 (B)	10 (D)	64
Misteldrossel	6 (C)	7 (C)	11 (D)	-	-	24
Mönchsgrasmücke	32 (E)	12 (D)	15 (D)	8 (D)	34 (E)	101
Rabenkrähe	3 (B)	2 (B)	-	2 (B)	2 (B)	9
Ringeltaube	9 (D)	6 (C)	10 (D)	2 (B)	4 (C)	31
Rohrhammer	-	-	-	-	4 (C)	4
Rotkehlchen	25 (E)	30 (E)	20 (D)	3 (B)	14 (D)	92
Schwanzmeise	2 (B)	-	-	-	-	2

Deutscher Name	Max. Revieranzahl auf Probeflächen					Gesamte Revieranzahl
	01	02	03	04	05	
Singdrossel	14 (D)	14 (D)	28 (E)	3 (B)	6 (C)	65
Sommergoldhähnchen	12 (D)	10 (D)	13 (D)	-	1 (A)	36
Stockente	-	1 (A)	2–3 (B)	2 (B)	4 (C)	9–10
Sumpfmeise	5 (C)	5 (C)	5 (C)	1 (A)	2 (B)	18
Sumpfrohrsänger	2 (B)	-	1 (A)	4 (C)	8 (D)	15
Tannenhäher	-	-	1 (A)	-	-	1
Tannenmeise	14 (D)	12 (D)	25 (E)	-	-	51
Wacholderdrossel	1 (A)	-	-	7 (C)	1 (A)	9
Waldbaumläufer	5 (C)	8 (D)	8 (D)	-	-	21
Weidenmeise	3 (B)	1 (A)	-	-	-	4
Wintergoldhähnchen	5 (C)	6 (C)	5 (C)	-	2 (B)	18
Zaunkönig	12 (D)	14 (D)	7 (C)	1 (A)	9 (D)	43
Zilpzalp	26 (E)	18 (D)	20 (D)	4 (C)	21 (E)	89

Legende:

HK: Häufigkeitsklasse je PF; Kategorien: **A:** 1 Revier, **B:** 2–3 Reviere, **C:** 4–7 Reviere, **D:** 8–20 Reviere, **E:** 21–50 Reviere, **F:** 51–150 Reviere und **G:** 151–400 Reviere.

NG: Nahrungsgast; **ÜF:** Überflieger; **DZ:** Durchzügler

¹⁾ Reviere dieser Art wurden aufgrund ihrer besonderen ökologischen Funktion punktgenau erfasst und werden in den Karten in Kapitel 8.2 dargestellt.