



Anhang 2: Kartierschlüssel Wald

Alnion	Alno-Ulmion	Tilio-Acerion	Fagion	Fagus sylvatica (B)	Eichen-Hainbuchenwald	
Alnus glutinosa (B)	Acer pseudoplatanus (B), Fraxinus excelsior (B)	Tilia platyphyllos (B), Tilia cordata (B)	Corylus avellana (S), Lonicera xylosteum (S), Sambucus nigra (S), Primula elatior	Carex sylvatica, Galium odoratum, Lamium galeobdolon, Phyteuma spicatum, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Viola reichenbachiana <i>(Alle Arten auch im Tilio-Acerion und Alno-Ulmion mit teils noch größerer Stetigkeit vertreten. Differenzierung v. a. anhand der Baumschicht, Krautschicht ggü. Luzulo-Fagetum)</i>	Quercus robur (B), Quercus petraea (B), Carpinus betulus (B)	
	Aegopodium podagraria, Allium ursinum, Circaea luteiana, Impatiens noli-tangere, Urtica dioica	Campanula trachelium, Salvia glutinosa, Mercurialis perennis, (Mycelis muralis)			Cornus sanguinea (S), Sorbus torminalis (S), Galium sylvaticum, Rosa arvensis, (Vicia sepium), Vincetoxicum hirsutinaria	
<b>Carici elongatae-Alnetum</b>	<b>Carici remotae-Fraxinetum</b>	<b>Fraxino-Aceretum</b>	<b>Aceri-Tilietum</b>	<b>Carici-Fagetum</b>	<b>Galio-Fagetum</b>	
<b>Schwarzerlen-Bruchwald</b>	<b>Schwarzerlen-Eschenwald</b>	<b>Ahorn-Eschen-Schluchtwald</b>	<b>Ahorn-Linden-Blockwald</b>	<b>Seggen-Buchenwald</b>	<b>Waldmeister-Buchenwald</b>	
	(Prunus padus (S))	Ulmus glabra (B)	Cornus sanguinea (S), Crataegus spec. (S), Ligustrum vulgare (S), Viburnum lantana (S), Carex digitata, Carex flacca, Euphorbia amygdaloides, Melittis melissophyllum, Neottia nidus-avis, Sanicula europaea, Solidago virgaurea, Vincetoxicum hirsutinaria, Viola mirabilis Acer campestre (B)	Sorbus torminalis (S) Sorbus aria (S)	<b>Luzulo-Fagetum</b> <i>(keine pflanzensoziologische Zuordnung)</i>	
					<b>Hainsimsen-Buchenwald</b>	
					<b>Eichen-Hainbuchenwald trockenwarmer Standorte</b>	
Carex acutiformis Carex paniculata Glyceria maxima Iris pseudacorus Lycopus europaeus Mentha aquatica Phragmites australis Sparganium erectum	Cardamine amara Carex pendula Carex strigosa Dryopteris affinis Equisetum hyemale Equisetum telmateja Rumex sanguineus Cardamine amara Carex brizoides, Carex remota, Chryso-splenium alternifolium, Festuca gigantea, Stachys sylvatica, Veronica montana  (Filipendula ulmaria) (Impatiens glandulifera)	Aruncus dioicus Phyllitis scolopendrium Polystichum aculeatum	Helleborus foetidus Tamus communis Viola hirta	Carex montana Cephalanthera damasonium Epipactis helleborine Melica nutans	Dryopteris filix-mas	Deschampsia flexuosa Carex digitata Carex montana Campanula persicifolia Buxus sempervirens (Fragaria vesca) Hypericum montanum Lathyrus linifolius Lithospermum purpurocaeruleum Melittis melissophyllum Tamus communis Viola mirabilis
				<i>Feuchte Ausbildung</i> Carex brizoides Carex pendula Circaea luteiana Impatiens noli-tangere Lysimachia nemorum Primula elatior	<i>Wärmegetönte Ausbildung</i> Corylus avellana (S) Ligustrum vulgare (S) Viburnum lantana (S) Campanula persicifolia Campanula trachelium Carex digitata Melittis melissophyllum Viola hirta Viola mirabilis <i>(Die meisten Arten kommen hier nur vereinzelt vor und haben ihren Verbreitungsschwerpunkt im Carici-Fagetum)</i>	<i>Wärmegetönte Ausbildung</i> Hieracium murorum Ilex aquifolium Poa nemoralis Solidago virgaurea Teucrium scorodonia